

La Enfermedad de la Punta Morada de la Papa Transmitida por las Cigarritas o Saltahojas



<http://oregonstate.edu/potatoes/ipm/insects/emerging.htm>

Síntomas Foliares



Las hojas de las plantas infestadas presentan características "puntas moradas". Plantas afectadas mueren prematuramente.



Los nódulos se hinchan y tornan morados; las ramas axiales se enlargan.



Tubérculos aéreos pueden formarse en las ramas.

Agente Causal

Nombre común: El fitoplasma de la enfermedad de la punta morada de la papa

Transmitido por: La cigarrita o saltahoja (ver reverso de esta tarjeta)

Hospedero: La cigarrita o saltahoja, la cual se refugia en varias malezas, papa, tomate, otros vegetales

Información adicional: La enfermedad es transmitida al inicio de la temporada del cultivo.

Washington State Potato Commission (Teléfono: 509-765-8845)

La Enfermedad de la Punta Morada de la Papa y las Cigarritas o Saltahojas



<http://oregonstate.edu/potatoes/ipm/insects/emerging.htm>

Identificación de Saltahojas o Cigarritas de la Papa en Trampas Amarillas

Las cigarritas o saltahojas de la papa vienen en dos colores o formas



Forma clara de la cigarrita o saltahoja de la papa

Forma oscura de la cigarrita o saltahoja de la papa

Forma oscura de la cigarrita o saltahoja de la papa

Algunas veces la cigarrita o saltahojas de la papa puede encontrarse dañada en las trampas amarillas.

Cigarrita o saltahoja de la papa = *Circulifer tenellus*

Otras cigarritas o saltahojas que NO transmiten la enfermedad de la punta morada en la papa



Empoasca

Exitianus

Dikraneura

Latalus

Sugerencias de muestreo:

1. Usar trampas pegantes amarillas de 3X5" o 4X6".
2. Colocar trampas cerca a campos de papa y/o malezas, lejos de terrenos arenosos.
3. Colocar trampas a 8-10 cms del suelo.
4. Check traps regularly, replace at least weekly.
5. Mayo y Junio son los meses mas importantes.

Washington State Potato Commission (Telefono: 509-765-8845)

